ضدانتیبیوتیک‌های نسل سوم برای درمان عفونت‌های مقاوم به چند دارو در بیمارستان‌های استان نارون‌کنار در حال تبدیل شدن به روتین درمانی هستند

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره مصرف بی‌رویه آزیترومایسین در مراقبت‌های سرپایی و بستری در ۷ استان کشور

(مخابرات/ایثار ام‌القرا)

بندرسیمین/ایثار ام‌القرا – ۱۴ ژوئن ۲۰۲۵: دکتر هادی نوروزی، رئیس مرکز تحقیقات عفونت‌های باکتریایی دانشگاه علوم پزشکی نارون‌کنار، در نشستی خبری اعلام کرد که مصرف آزیترومایسین در بیمارستان‌های استان نارون‌کنار در سال گذشته حدود ۴۱ درصد افزایش داشته است. به گفته وی، بخش عمده این مصرف برای عفونت‌های تنفسی در بیماران سرپایی بدون نسخه انجام شده و در برخی از داروخانه‌های شهرستان‌های دشت‌آبگینه و کوهسار، این دارو بدون آزمایش کشت و آنتی‌بیوگرام به بیماران داده می‌شود.

نوروزی گفت: «مصرف گسترده آزیترومایسین باعث شده باکتری‌های گرم‌منفی در این استان به سرعت نسبت به این دارو مقاوم شوند و در آینده ما با موارد عفونت‌هایی روبه‌رو خواهیم شد که هیچ آنتی‌بیوتیکی روی آن‌ها اثر نمی‌کند. این وضعیت دقیقاً همان چیزی است که سازمان جهانی بهداشت آن را یکی از تهدیدهای جدی سلامت عمومی در قرن بیست‌ویکم می‌داند.» به گفته او، میانگین مقاومت باکتری‌های گرم‌منفی نسبت به آزیترومایسین در این استان از ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ درصد در سال جاری رسیده است.

سازمان جهانی بهداشت در بیانیه‌ای اعلام کرد که مصرف آزیترومایسین در بیماران سرپایی باید تنها در صورت وجود علائم بالینی مشخص و با تجویز پزشک صورت گیرد. این سازمان توصیه کرده است که داروخانه‌ها ملزم به ثبت نسخه‌های فروخته‌شده و ارائه گزارش ماهانه به مراکز بهداشت استان شوند. در حال حاضر، در استان نارون‌کنار تنها ۱۲ درصد داروخانه‌ها چنین گزارشی ارائه می‌دهند.

دکتر نوروزی افزود که تیم تحقیقاتی مرکز قصد دارد نمونه‌های ادرار و خلط بیماران مبتلا به عفونت‌های مقاوم را در آزمایشگاه مرکزی بندرسیمین بررسی کند و نتایج آن ظرف سه ماه آینده منتشر شود. وی گفت: «ما نمی‌خواهیم بگوییم پزشکان خطا می‌کنند، اما وقتی یک دارو سال‌ها بدون کنترل مصرف می‌شود، طبیعی است که میکروب‌ها یاد بگیرند در برابرش مقاوم شوند و ما باید جلوی این روند را بگیریم.»

در واکنش به این گزارش، سخنگوی وزارت بهداشت استان نارون‌کنار اعلام کرد که دستورالعمل جدیدی برای نسخه‌نویسی آزیترومایسین تا پایان تیرماه منتشر خواهد شد. بر اساس این دستورالعمل، پزشکان عمومی تنها در صورت وجود علائم تنفسی همراه با تب بالای ۳۸ درجه سانتی‌گراد و نتیجه آزمایش کشت مجاز به تجویز این دارو خواهند بود. داروخانه‌ها نیز موظف می‌شوند نسخه‌های بدون کشت را ثبت نکنند و گزارش آن را به مرکز بهداشت استان ارسال کنند.

در مقابل، برخی از پزشکان عمومی شهر بندرسیمین نگران کاهش دسترسی بیماران به درمان هستند. یکی از پزشکان که نخواست نامش فاش شود گفت: «در مناطق روستایی نزدیک‌ترین داروخانه تا ۴۰ کیلومتر فاصله دارد و بیمار نمی‌تواند هر بار برای گرفتن یک قرص برگردد. اگر قرار است محدودیت باشد، باید همراه با آموزش و دسترسی باشد، نه صرفاً با ممنوعیت.» مرکز بهداشت استان وعده داد که برای این موضوع نیز راهکار جداگانه ارائه شود.

(مخابرات/ایثار ام‌القرا)

هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره مصرف بی‌رویه آزیترومایسین در مراقبت‌های سرپایی و بستری در ۷ استان کشور

«۱۵ · ۵» و ماکروفاژهای بافت ریوی را تضعیف می‌کند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که مصرف گسترده آزیترومایسین در سطح استان، حتی در بیمارانی که هیچ عفونت باکتریایی ندارند، می‌تواند به ایمنی جامعه آسیب جدی وارد کند. سازمان توصیه کرده است که پزشکان پیش از تجویز آزیترومایسین، کشت خلط و آزمایش حساسیت را انجام دهند و داروخانه‌ها ملزم به ثبت هر نسخه در سامانه ملی دارو شوند.

دکتر نوروزی گفت: «ما با یک بحران مقاومت دارویی روبه‌رو هستیم که اگر همین امروز جلوی مصرف بی‌رویه گرفته نشود، ده سال دیگر درمان عفونت‌های ساده به یک مسئله بزرگ تبدیل می‌شود.» وی افزود که مرکز بهداشت استان تا پایان تیرماه فهرستی از داروخانه‌های متخلف را منتشر خواهد کرد و از مردم خواست شماره تلفن ۱۱۰۴ مرکز بهداشت را برای گزارش تخلف ذخیره